

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 25-4-66 458065

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 12 numéros par an

EDITION DE LA STATION DU MIDI (Tél. 52.73.20)

(ARIÈGE, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT, HAUTES-PYRÉNÉES,
TARN, TARN-ET-GARONNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 11, rue de la Pieau - TOULOUSE.

C. C. P. : TOULOUSE 8614-19

Abonnement Annuel

15 F,00

- Supplément n° 1 au Bulletin n° 67 -

1966 - 10

- A V E R T I S S E M E N T S -

ARBRES FRUITIERS

. Tavelures du poirier et du pommier :

Des taches apparaissent depuis quelques jours déjà. Il s'agit de la seconde série pour le poirier et de la première pour le pommier. Il est probable que les sorbes vont se poursuivre sans discontinuer au cours des prochains jours. Comme d'autre part les émissions de germes hivernants, lors des pluies, se trouvent dans leur période de plus grande intensité, il est prudent d'effectuer un nouveau traitement soigné.

. Araignées rouges (*Panonychus ulmi*) :

Dans de nombreux vergers, les éclosions d'oeufs d'hiver sont très avancées les premiers adultes commencent à apparaître et il est probable que leur ponte va débiter dans les jours à venir.

En conséquence, il est nécessaire d'appliquer dès à présent un traitement spécifique.

Sur les arbres en cours de floraison, employez un produit non toxique pour les abeilles, tels que : Dicofol (produit homologué) Diéthion, Phosalone (produits en autorisation provisoire de vente contre les acariens).

V I G N E

. Black-rot :

Les projections de germes hivernants (ascospores) sont de plus en plus importantes au cours des pluies. En outre, la végétation de la vigne s'accroît rapidement depuis quelques jours.

Dans les foyers, il y a donc lieu d'effectuer une nouvelle application.

- I N F O R M A T I O N S -

ARBRES FRUITIERS

. Pucerons :

Le relèvement de la température est favorable au développement des colonies établies.

Combattre ces insectes en employant un produit aphicide non toxique pour les abeilles, sur les arbres en cours de floraison ; sinon attendre la défloraison.

.../...

P 91

V I G N E

. Mildiou :

Exceptionnellement, des foyers primaires ont pu s'établir dans les situations à végétation précoce, à l'occasion des pluies qui ont débuté à partir du 9 Avril.

Il est donc recommandé de supprimer soigneusement les repousses inutiles, en particulier celles de la base sur lesquelles le champignon a pu s'installer.

. Oïdium et Erinose :

Effectuer par temps chaud une application de soufre dans les vignes habituellement sensibles et dont les premières feuilles sont déjà étalées.

. Araignées rouges et jaunes :

Les éclosions d'araignées rouges sont commencées (*Panonychus Ulmi*) alors que l'araignée jaune (*Eotetranychus carpini*) a repris son activité.

Dans les vignes atteintes en 1965, un traitement pourrait être appliqué dans les derniers jours de la semaine en cours.

CULTURES LEGUMIERES

. Botrytis du fraisier :

Continuer à assurer la projection des cultures en employant un produit à base soit de Captane ou de Phaltane à 250 g. MA/hl, soit de T.M.T.D. à 30 g. de MA/hl.

. Rouille de l'Ail :

Les premières taches sont apparues depuis quelques temps et il y a lieu de craindre une multiplication des attaques lors des périodes pluvieuses à venir. Des pulvérisations à base de Manèbe ou de Mancozèbe à raison de 240 g. MA/hl permettront de limiter l'extension de la maladie.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles

J. BESSON - E. JOLY

TOULOUSE, 1e 18 AVRIL 1966
L'INSPECTEUR DE LA PROTECTION
DES VEGETAUX
L. IMBERT

Imprimés à la Station d'Avertissements Agricoles du MIDI
Le Directeur-Gérant : L. BOUYX